

PROTOCOLLO  
INFILTRAZIONE FERITE  
CHIRURGICHE  
CON ANESTETICO LOCALE

DOTT. CINETTO ANDREA

ANESTESIA RIANIMAZIONE  
OSPEDALE DI CHIOGGIA  
DIRETTORE: DOTT. M. TEDESCO

# INFILTRAZIONE FERITA CHIRURGICA CON ANESTETICO LOCALE NELL'ADULTO

LEVOBUPIVACAINA (CHIROCAINA) 0,25 %  
(LEVOBUPIVACAINA 0,75 % = 3,3 ml PORTATI A 10  
CON SOLUZIONE FISIOLÓGICA)  
3 ml/cm DI LUNGHEZZA  
DELL'INCISIONE CHIRURGICA.

NON SUPERARE IL DOSAGGIO MASSIMO  
DELLA LEVOBUPIVACAINA  
PARI A 4,5 mg/Kg PESO CORPOREO



# INIEZIONE INTRA-ARTICOLARE DI ANESTETICO LOCALE DOPO ARTROSCOPIA NELL'ADULTO

LEVOBUPIVACAINA (CHIROCAINA) 0,75 %  
10 ml INTRA-ARTICOLARE  
DOPO ARTROSCOPIA

NON SUPERARE IL DOSAGGIO  
MASSIMO DELLA LEVOBUPIVACAINA  
PARI A 4,5 mg/Kg PESO CORPOREO

# INFILTRAZIONE FERITA CHIRURGICA CON ANESTETICO LOCALE NEL BAMBINO

LEVOBUPIVACAINA (CHIROCAINA) 0.2 %  
(LEVOBUPIVACAINA 0,75 % = 2,6 ml PORTATI  
A 10 ml CON SOL. FISIOLOGICA) -  
2 ml/cm DI LUNGHEZZA DELLA INCISIONE  
CHIRURGICA

NON SUPERARE IL DOSAGGIO MASSIMO  
DELLA LEVOBUPIVACAINA  
PARI A 4,5 mg/Kg PESO CORPOREO

# BIBLIOGRAFIA

- Rizzo D. et altri: Infiltrazione della ferita chirurgica nel trattamento del dolore post-operatorio. ALR 2000; 9: 69-72.
- AIFA AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: Infiltrazione della ferita chirurgica nel bambino. 2008-007996-26.